

(藏)

(一)視病者之法何如，使其步行，或行他稀松較速運動，

(二)如病者有不遂意之事，視能力能做到的去做成，令其愉快，

(三)令病者早晚各如廁一次，應無大便亦須行之，俾積滯易通，

(四)常常以愉快之故事，向病者傾談，使其樂意，

(五)病者如頭不熱，舌苔不滯，並解大便，時與其作公園之遊，以促其恢復健康。

治頭痛奇效法

（江少萱代作）

骨痛、素患足疾、在於右腿之錢、筋經兩旁、一日一發、發時刀鋸、牙關吃緊、苦不可當、一時即止、無日不發、遍請中西醫藥、罔效、惟有西藥水、截時止痛、不過減輕、終難治愈、二年矣、診其脈息滑濡、舌潤而膩、余曰陽明主宗筋、濕久生積於胃中、宗筋不利、其痛在胃耳、吾有一方可治此病、易如反掌、即以金匱風引湯施治、(方中秦石石滑石石薑黃石英白石膏脂龍龍骨牡蠣甘草桂枝乾姜大黃)夫陽明在腑象爲腸土、在氣分爲體骨壯脾甘草桂枝乾姜大黃)夫陽明在腑象爲腸土、在氣分爲體骨壯脾甘草桂枝乾姜大黃)夫陽明在腑象爲腸土、在氣分爲體骨壯脾

金色白、故以六石色白入胃、況六土石質、以土入土、同氣相求、重鎮之也、更有他藥、辛者散、降者降、寒溫補瀉並用、病延乃緩攻之法也、將此方作散、每次用七錢、連服十次、其痛惟有些來強而已、脈已轉細濡、而口時渴、禁食油膩、獨用代茶、考冬瓜微甘補土、微涼退熱、如不服則有些赤強、常服數年間共服多瓜二三千斤、身體漸漸康健安然。

乃緩攻之法也，將此方作散，每次用七錢，連服十次，其痛
 惟有寒強而已，脈已轉細濡，而口時渴，禁食油膩，獨用
 代茶，考冬瓜微甘補土，微涼退熱，如不服則有些赤強，常服
 數年間共服多瓜二三千斤，身體漸漸康健安然。

已於冬令發成，外去冬令發成，其第一次出品之益肺片附
 本大藥房，外去冬令發成，其第一次出品之益肺片附
 本大藥房，外去冬令發成，其第一次出品之益肺片附

總發行所

中國醫學院

上海小西門外黃家路

良安君云：黑木丸可治婦人，
雖然，此物有養陰生血之
效，如再加三七之通經行瘀，黑
通經行瘀，而無耗散之害，
之弊，此方誠能對證，試用
〔研末〕滋水沖服，加冰糖一
匙，供其味平，連服三四劑，
服此方僅一星期效如鼓應，
化痰。先用黑木丸，蒸熬成
膏，如膏相相似，其滑在水
中，可見三七通經破瘀之力最
甚，故此二物，最有補血養胃
之功。此丸區區之所厚望也，
以消解無陰之邪，俟以上升，
作痢，服藥無效，宜用石膏人參
湯，以清解無陰之邪，俟以上升，
痢疾中之苦藥湯，以干姜易去肉
桂，今之世俗，使干姜與川連同
搗，以免世俗之不效者用，
諸君逆洗挽洗法，用敗毒散治
痢疾，可謂盡善矣，然必用於表
症，方盛之際，庶幾有效，
痢疾邪已解，而後重不除者，
氣虛、紅腫大腸道滑，用礬不
用固、補中益氣加白芍木香宜
下痢口渴紅黃，乃厥陰熱痢，
用白頭翁湯，
痢疾，因有外感內熱，互相下陷
之病，服藥無效，宜用石膏人參
湯，以清解無陰之邪，俟以上升，
痢疾中之苦藥湯，以干姜易去肉
桂，今之世俗，使干姜與川連同
搗，以免世俗之不效者用，
諸君逆洗挽洗法，用敗毒散治
痢疾，可謂盡善矣，然必用於表
症，方盛之際，庶幾有效，
痢疾邪已解，而後重不除者，
氣虛、紅腫大腸道滑，用礬不
用固、補中益氣加白芍木香宜
下痢口渴紅黃，乃厥陰熱痢，
用白頭翁湯，

治崩中赤白，得槐花枳實治
血中。出疹痛不止，則由肺邪鬱
屬，以枳殼川連等分，槐花
并炒去槐用二味煎好入乳香
各八分、治腹痛如神、
子、治久痢久瀉，飯後硃砂

虎變色
流行病

痧疹淺說(續)

以上兩獨子爲君，製首烏爲臣
考生薑名尤爲佐使，餘藥則
加自加，如久痢加香連、條葉則
加山藥、除睡加益母違志，

趙養葵明
六味黃湯
八味丸
三消
蓋人味九
而火渴止
意耳、前醫
治下消症
用正氣丸
此少

中風痰涎壅盛、口眼歪斜、不能
言語者皆宜用吐法，小便不利、可利之。
凡中風症也，小便利、可利之。

類中證，皆以二陳加竹瀝姜汁

(楊志一)

發則先動見於陽，而後及於陰，故一身之中，凡頭面背及四肢之諸陽部宜多，而胸腹腰及四肢向內之諸陰部宜少，陽部透而不透者無害，陰部透而陽部不透者爲險。
 ❶ 痧疹之逆證
 乾枯，一出卽沒者，鼻扇口張目無神者，鼻青寒裹者，熱極喘胸高肩息狂言動血，獨手搖頭，尋衣摸床，狂惡便秘，口出臭汗，紅紫點疹，脈沉數細軟者，邪伏不出，變成悶痧者。
 ❷ 痧疹之禁忌
 痧症生冷受風忌寒用苦寒遏閉，忌用辛熱助火，忌用補益留邪之法，首重隔離，請參閱本報五十七猩紅熱預防篇。
 ❸ 痧疹之預防